

利巴韦林片
RIBAVIRIN TABLETS



利巴韦林片

RIBAVIRIN TABLETS

100mg×(12片/24片/36片) / 盒



国家基药
医保甲类

国药准字 H19993072

■ 广 谱

可有效抑制22种以上DNA和RNA病毒, 包括呼吸道合胞病毒、流感病毒、甲肝病毒、腺病毒等。

■ 安全性高

高选择性地抑制病毒复制, 不影响病毒感染的宿主细胞活性; 儿童可用。

经典广谱抗病毒药 — 多指南权威推荐

指南及专家共识推荐

说明书适应症

- 呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎
- 皮肤疱疹病毒感染
- 成人慢性丙型肝炎

《手足口病治疗指南》2018年

- 手足口病的重症病例

《国家抗微生物治疗指南》(第二版)

- 流行性出血热
- 成人麻疹 (儿童麻疹不用)

《丙型肝炎防治指南》2019年版

- 成人慢性丙型肝炎

简明处方资料

【药品名称】 通用名称：利巴韦林片

【性 状】 本品为白色或类白色椭圆形薄膜衣片，除去包衣后显白色或类白色。

【适 应 症】 1、适用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎；皮肤疱疹病毒感染。
2、与干扰素α联合使用，治疗成人慢性丙型肝炎。

【规 格】 100mg

【用法用量】 口服

1、病毒性肺炎与支气管炎：成人一次0.15g。一日3次，疗程7天。皮肤疱疹病毒感染：成人一次0.3g(3片)，一日3次，疗程7天。小儿每日按体重10mg/kg：分4次服用，疗程7天。

2、成人慢性丙型肝炎：利巴韦林剂量为成人每日800mg~1200mg，或15mg/kg，分两次服用或遵医嘱。建议疗程为24至48周。

利巴韦林制剂不能单独使用治疗慢性丙型肝炎。用药时须在医师指导下，根据疾病特征（如基因型）、治疗反应和耐受性进行个体化调整剂量。干扰素α的用法用量请参阅相关说明书。剂量调整详见说明书。

【禁 忌】 1、孕妇、可能怀孕的女性及其男性伴侣禁用。哺乳期妇女禁用。
2、对本药成分或其他核苷类似物（阿昔洛韦，更昔洛韦，阿糖腺苷等）有过敏史的患者禁用。
3、控制困难的心脏疾病（心肌梗死、心力衰竭、心律失常等）患者禁用。
4、血红蛋白病患者（如地中海贫血、镰状细胞性贫血）禁用。
5、慢性肾功能衰竭或肌酐清除率在 50ml/min以下的肾功能不全患者禁用。
6、严重的抑郁症、有自杀企图或自杀意念等的严重精神病患者或病史的患者禁用。
7、肝功能失代偿患者禁用。
8、自身免疫性肝炎患者禁用。
9、禁止与去羟肌苷合用。临床试验中有致死性肝衰竭、周围神经病变、胰腺炎、高乳酸血症、乳酸酸中毒的报告。

【贮 藏】 密封保存。

【包 装】 口服固体药用高密度聚乙烯瓶（内置固体药用纸袋装硅胶干燥剂）；12片/瓶，24片/瓶，36片/瓶。

【有 效 期】 24个月

【批准文号】 国药准字H19993072

【生产企业】 江苏晨牌药业集团股份有限公司

