

盐酸环丙沙星片

CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE TABLETS



- 第三代喹诺酮类广谱抗菌药物
- 对多种G⁺和G⁻高度敏感
- 口服吸收迅速，组织穿透力强

多种感染疾病经验性治疗首选用药



● 0.25g × 12片 × 1板/2板/3板 /盒

用于治疗或预防确诊或高度怀疑的敏感菌感染，包括泌尿系统、生殖道、皮肤及软组织、骨及关节、复杂性腹腔内、呼吸系统、胃肠道等感染。

国内外指南共同推荐

《IDSA抗生素耐药性革兰阴性菌感染治疗指南》2020年版

- 治疗ESBL-E引起的肾盂肾炎和复杂性尿路感染(cUTI)：推荐首选厄他培南，美罗培南，亚胺培南-西司他丁，环丙沙星，左氧氟沙星或复方磺胺甲噁唑。
- 治疗CRE引起的非复杂性膀胱炎：推荐首选环丙沙星，左氧氟沙星，复方磺胺甲噁唑，呋喃妥因或单剂量氨基糖苷类。

《中国成人医院获得性肺炎与呼吸机相关性肺炎诊断和治疗指南》2018年版

- VAP患者的初始经验性抗感染治疗：MDR菌感染低风险、高风险均推荐使用环丙沙星。
- HAP / VAP常见耐药菌抗感染治疗：铜绿假单胞菌、嗜麦芽窄食单胞菌感染推荐使用环丙沙星。

《2019年慢性阻塞性肺疾病急性加重抗感染治疗中国专家共识》

- COPD患者有铜绿假单胞菌感染风险如能口服可选用环丙沙星或左氧氟沙星，需要静脉用药时可选择抗铜绿假单胞菌的β-内酰胺类或联合左氧氟沙星。

《IDSA感染性腹泻诊治指南》2017年版

- 感染性腹泻经验性治疗：成年患者经验性抗菌治疗可使用喹诺酮类药物，如环丙沙星或阿奇霉素，具体用药方案需结合当地易感病原体或患者旅行史（强推荐，中等级）。

简明处方资料

【药品名称】 通用名称：盐酸环丙沙星片

【性 状】 本品为白色或类白色片或薄膜衣片，除去包衣后显白色至微黄色。

【规 格】 按C₁₇H₁₈FN₃O₃计0.25g

【适 应 症】 为减少耐药菌的产生及维持本品与其他抗菌药物的疗效，本品只能用于治疗或预防确诊或高度怀疑的敏感菌感染。一旦获得培养和药敏试验结果，则应当考虑转换或调整抗生素治疗方案。如果未获得这些数据，则应根据当地流行病学和药敏数据经验性选择适当抗生素治疗。如果疑似厌氧菌感染，则应当给予合理治疗。在治疗前，应当进行适当的细菌培养和药敏试验，以便分离和鉴定导致感染的微生物，并确定它们对环丙沙星的敏感性。可在得知这些试验的结果前使用本品进行治疗；一旦获得结果，应当继续给予适当的治疗。与其它药物相似，铜绿假单胞菌的部分菌株在环丙沙星治疗期间可快速产生耐药性。在治疗期间，定期进行细菌培养和药敏试验不仅可提供抗生素治疗效果的信息，而且还可提供可能的细菌耐药性信息。

1.皮肤和皮肤软组织感染；2.骨和关节感染；3.复杂性腹腔内感染；4.感染性腹泻；5.伤寒热（肠性发热）；6.吸入性炭疽（暴露后）；7.瘟疫；8.慢性细菌性前列腺炎；9.下呼吸道感染；10.泌尿道感染；11.急性鼻窦炎

【贮 藏】 避光，密封保存。

【有 效 期】 24个月

【批准文号】 国药准字 H32021943

【生产企业】 江苏晨牌药业集团股份有限公司

【用法用量】、【不良反应】、【注意事项】及适应症详情等详见药品说明书。



电 话：027-62438189
网 址：<http://www.whjzym.com>
地 址：湖北省武汉市武昌区中北路86号万达汉街总部国际D座1208室

了解更多，欢迎扫码关注