


**国家集采  
第一顺位中标**



**国家基药 医保乙类**

**注射用更昔洛韦**

0.25g/0.5g



## 抗病毒经典用药


▶ 多指南及专家共识推荐

▶ 安全、有效控制多种疱疹及呼吸道病毒感染



更昔洛韦是一种合成鸟嘌呤的同系物，在体内可抑制疱疹病毒的复制，包括单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、EB病毒和巨细胞病毒等，尤以对缺乏胸苷激酶的耐药毒株及巨细胞病毒的作用显著；此外，对乙肝病毒、腺病毒及疱疹VI病毒亦有较强作用<sup>[1-3]</sup>。我公司生产的注射用更昔洛韦已通过一致性评价，具有与原研药品相同质量和疗效，目前广泛应用于临床。

### 更昔洛韦抗病毒作用机制明确



### 更昔洛韦具有广谱的抗病毒作用

临床常用科室：儿科、呼吸科、皮肤科、器官移植中心、感染科、消化科、口腔科、眼科等科室。




1. 傅绍军,朱利民,等.抗巨细胞病毒药物-更昔洛韦[J].国外医药抗生素分册,2004,25(6):282-286.  
 2. TothK,YingB,TollefsonAE,et al.Valganciclovir inhibits human adenovirus replication and pathology in permissive immunosuppressed female and male Syrian hamsters[J].Viruses,2015,7(3):1409-1428.  
 3. 黄视青,龚作炯,等.更昔洛韦的体外抗乙肝病毒活性[J].中国医院药学杂志,2000,20(10):589-592.


# 巨细胞病毒感染首选用药

安全、有效控制巨细胞病毒引起的多种感染 / 对单纯疱疹、水痘-带状疱疹、EB病毒高度敏感


▶ 研究显示：更昔洛韦联合人免疫球蛋白治疗小儿腺病毒肺炎总有效率95.56%<sup>[4]</sup>



▶ 研究显示：更昔洛韦可改善症状性CMV感染的预后，降低其死亡率<sup>[5]</sup>



▶ 研究显示：更昔洛韦治疗带状疱疹疗效显著，在改善患者症状及体征方面明显优于阿昔洛韦<sup>[6]</sup>



4. 徐佳莉, 王莹, 等. 人免疫球蛋白联合更昔洛韦治疗小儿腺病毒肺炎的临床研究[J]. 现代药物与临床, 2017, 32(6): 1101-1104.

5. 徐亚萍, 吴苔, 等. 更昔洛韦对先天性及围产期巨细胞病毒感染远期疗效[J]. 中国妇幼保健, 2006, 21: 2970-2972.

6. 贾冬梅, 苏海辉, 等. 更昔洛韦治疗带状疱疹多中心开放研究[J]. 中国皮肤性病学杂志, 2006, 20(9): 538-539.

## 指南及专家共识推荐

- 《抗病毒药物在儿童病毒感染性呼吸道疾病中的合理应用指南》2020年

对CMV、单纯疱疹病毒(HSV)-I型、(HSV)-II型、水痘-带状疱疹(VZV)具有抑制作用，是目前CMV感染的首选药物。

- 《儿童病毒性肺炎中西医结合诊治专家共识》2019年

更昔洛韦(ganciclovir, GCV)是儿童CMV感染的一线用药。CMV肺炎患儿可先作诱导治疗，5mg/(kg·次)，每12h1次，静脉滴注，持续2周后再维持治疗：10 mg/(kg·次)，每周3次，持续3个月或5 mg/(kg·次)，每日1次，根据病情持续疗程10d以上。

- 《器官移植受者巨细胞病毒感染临床诊疗规范》2019版

静脉滴注更昔洛韦为抗CMV病或CMV综合征的一线治疗用药，可以用于预防、抢先治疗和CMV病治疗。预防用药剂量为5mg/kg，每日1次；治疗剂量为5mg/kg，每日2次。

## 简明处方资料

**【药品名称】** 通用名称：注射用更昔洛韦

**【适应症】** 适用于治疗危及生命或视觉的免疫缺陷患者的巨细胞病毒感染，以及预防器官移植病人的巨细胞病毒感染。

**【用法用量】** 本品的复溶和稀释必须在医疗保健专业人员监督下进行，必须以静脉输注方式给药。

**注意事项：**本品只能通过静脉输注给药，时间必须超过1小时，最好通过塑料套管，输入有适当血流的静脉（由于更昔洛韦溶液的pH值较高（~11），肌注或皮下注射可能导致重度组织刺激）。不得通过快速静脉输注或推注给药，因为血浆水平过高可能增加本品的毒性。不得超过

推荐的剂量、频次和输注速度。

肾功能正常患者的剂量

①诱导治疗：剂量为5mg/kg，静脉输注1小时以上，每12小时一次，疗程14~21天。应当依据患者个体情况确定维持治疗的持续时间。

②维持治疗：5mg/kg，静脉输注1小时以上，每天一次，每周7次；或6 mg/kg，每天一次，每周5次。应当依据患者情况确定维持治疗的持续时间。

特殊用药指导参考药品说明书

**【贮藏】** 密闭，在30℃以下保存。

**【生产企业】** 武汉普生制药有限公司



武汉九州钰民医药科技有限公司



电话:027-62438189

网址:<http://www.whjzym.com>

地址:湖北省武汉市武昌区中北路86号万达汉街总部国际D座1208室

了解更多，欢迎扫码关注